AUTORES

- Nuria Guerra Luján
- Francisco Mendoza Álamo
- Carmen Mendoza Sosa
- Abraham Ramos Viera
- Cristina Robaina López
- Rut Suárez Vega
- Sonia Vega Sosa

FASES DEL SIDA

1º FASE: FASE PRECOZ (Infección primaria).

-A partir de las tres semanas aparecen los síntomas pseudogripales (síndrome clínico agudo: fiebre, cefalea, faringitis, etc.).

-No a todos los sujetos se le presentan los síntomas.

-Son altamente contagiosos.

-El virus se encuentra en la sangre y en los linfocitos.

-Infección aguda: se multiplica a gran velocidad.

-Desarrolla los anticuerpos pasadas algunas semanas o meses. → Seropositivo.

2º FASE: FASE DE LATENCIA CLÍNICA.

-Asintomática → 10 ó más años.

-Se continúa replicando el virus produciendo una destrucción progresiva del sistema inmunológico.

-El recuento de linfocitos T CD4 es normal.

3º FASE: S.I.D.A.

-Las defensa del organismo ya están muy debilitadas favoreciendo la aparición de enfermedades "oportunistas" leves (tuberculosis, neumonía, tumores, enfermedades neurológicas).

-Enfermedades leves → Debilidad del sistema inmunitario → Fuertes